

Důležitá upozornění**...pro výživu Vašeho dítěte**

Vylučné kojení je v prvních šesti měsících života pro Vaše dítě ideální. Jako každá pokračovací kojenecká výživa by se neměla ani pokračovací kojenecká výživa HiPP HA2 Combiotik® používat v prvních šesti měsících jako náhrada mateřského mléka, ale zásadně až po šesti měsících jako součást smíšené stravy. Individuální růstové a vývojové potřeby Vašeho dítěte mohou vést k nutnosti dřívejšího použití pokračovací kojenecké výživy jako součásti smíšené stravy. V tomto případě se prosím poradte s lékařem nebo osobou kvalifikovanou v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě.

...při stávající alergii na bílkoviny kravského mléka

HiPP HA2 Combiotik® nepoužívejte při stávající alergii na bílkovinu kravského mléka ani při podezření na vznik alergie.

...pro zuby Vašeho dítěte

Stejně jako mateřské mléko, obsahuje také každá kojenecká výživa sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů s tekutinou obsahující sacharidy, může způsobit vznik zubního kazu a s tím související zdravotní potíže. Krmte proto své dítě plynule, nenechávejte ho z láhve dlouho pít a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku.

Složení

Laktóza (z mléka), rostlinné oleje (palmový olej*, řepkový olej, slunečnicový olej), škrob, **hydrolyzovaná bílkovina mléčné syrovátky**, galaktooligosacharidy z **laktózy (z mléka)**, vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, chlorid draselný, emulgátor – estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou, L-tyrosin, hydroxid draselný, hydroxid sodný, vápenaté soli kyseliny citronové, L-askorban sodný (vitamin C), uhličitán hořečnatý, draselné soli kyseliny citronové, síran hořečnatý, L-tryptofan, uhličitán vápenatý, síran železnatý, síran zinečnatý, přírodní kultury mléčného kvašení (Lactobacillus fermentum hereditum[†]), D-panthotenát vápenatý (vitamin D), retinyl acetát (vitamin A), nikotinamid, síran měďnatý, DL-alfa-tokoferyl acetát (vitamin E), thiamin hydrochlorid (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), jodidan draselný, kyselina listová, fytomenadion (vitamin K), selenan sodný, D-biotin, cholekalciferol (vitamin D), kyanokobalamin (vitamin B12), BEZ LEPKU (dle zákona). 1) Lactobacillus fermentum CECT5716 *palmový olej z trvale udržitelného zemědělství - certifikované nezávislými kontrolními orgány. Výrobek je vyroben ze surovin přírodních barevných variací. Vztahuje se k sušenému stavu.

Návod k přípravě

Je důležité dodržovat návod k přípravě, podmínky uchování, skladování a zacházení s výrobkem, aby nedošlo k ohrožení zdraví dítěte.

Dodržujte přesně tento návod na přípravu kojenecké výživy i uvedená doporučení. Nesprávná příprava nebo uchování připravené láhve by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte. Proto připravujte výživu před každým krmením čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu a při teplotě max. 25 °C. Spotřebujte do 3 týdnů po otevření.

Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření).

Pitnou vodu před každou přípravou čerstvě převaříme a necháme zchladnout na teplotu cca 40 až 50 °C.*

2/3 připravené vody nalijeme do láhve.

Odměrkou lehce naplníme výrobkem a opačnou stranou nože zarovnáme. Odměřené množství výrobku přidáme do láhve.



Láhev uzavřeme a důkladně protřepeme.

Přidáme zbytek vody a opět několikrát důkladně protřepeme.

Zchladíme na teplotu, vhodnou k pití (cca 37 °C). Teplotu ověříme.

*Aby nedošlo k poškození přírodních kultur mléčného kvašení (Laktobacily), nepřeléváme výrobek vařící vodu.

Množství nápoje a dávkování

Množství nápoje na láhev může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Doporučené množství nápoje a počet lahvi na den jsou pouze orientační. **Používejte prosím přiloženou odměrku!**

Množství připravené výživy (ml)	Na jednu dávku potřebujete	
	Množství převařené pitné vody (ml)	Počet odměrek
170	150	5
200	180	6
235	210	7

1 odměrka prášku = 30 ml převařené pitné vody.

Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným příkrmem ve skle nebo kaši odpadá jedno jídlo v láhvi.