

Dôležité upozornenia

Výlučné dojenie je pre Vaše dieťa to najlepšie v prvých šiestich mesiacoch. Pokiaľ budete chcieť použiť HiPP HA2 dojčenskú výživu, poraďte sa prosím s lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa. HiPP HA2 Combiotik® je dojčenská výživa určená pre diétny režim pri znižovaní rizika vzniku alergie v dojčenskom veku a súvisiacich prejavov alergických, od ukončenia 6. mesiaca ako súčasť zmiešanej stravy a môže byť podávaná len na odporúčanie lekára a pod lekárskej dohľadom. Ako každá následná dojčenská výživa by sa nemala ani HiPP HA2 Combiotik® používať v prvých šiestich mesiacoch ako náhrada materského mlieka, ale zásadne až po šiestich mesiacoch ako súčasť zmiešanej stravy. **HiPP HA2 Combiotik® nepoužívajte pri alergií na kravské mlieko ani pri podozrení na vznik alergie. Poradte sa so svojim lekárom. Výrobok nesmie byť konzumovaný dojčatami, ktoré sú alergické na mliečne bielkoviny. Nevhodné k parenterálnemu užívaniu.** Tak ako materské mlieko, aj dojčenská výživa obsahujú sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy Vášho dieťaťa. Častý alebo trvalý kontakt zubov so sacharidmi môže spôsobiť vznik zubného kazu. Preto nenechávajte Vaše dieťa dlho piť z fľaše a naučte ho čo najskôr piť z pohára. Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

Zloženie

Laktóza (z mlieka), rastlinné oleje (palmový olej*, repkový olej, slnečnicový olej), škrob, **hydrolyzovaná bielkovina mliečnej srvátky**, galaktooligosacharidy z **laktózy (z mlieka)**, vápenaté soli kyseliny orthofosforečnej, chlorid draselný, emulgátor – estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou citrónovou, L-tyrosín, hydroxid draselný, hydroxid sodný, vápenaté soli kyseliny citrónovej, L-askorbát sodný (vitamin C), uhličitán horečnatý, draselné soli kyseliny citrónovej, síran horečnatý, L-tryptofán, uhličitán vápenatý, síran železnatý, síran zinočnatý, prírodné kultúry mliečneho kvasenia (Lactobacillus fermentum hereditum¹⁾), D-pantotenát vápenatý, retinyl acetát (vitamin A), nikotinamid, síran meďnatý, DL-alpha tokoferyl acetát (vitamin E), tiámín hydrochlorid (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxín hydrochlorid (vitamin B6), jodid draselný, kyselina listová, fytomenadión (vitamin K), selenan sodný, D-biotín, cholecalciferol (vitamin D), kyanokobalamin (vitamin B12). **BEZGLUTÉNOVÝ** (podľa zákona). ¹⁾ Lactobacillus fermentum CECT5716 *palmový olej z trvalo udržateľného poľnohospodárstva - certifikované nezávislými kontrolnými orgánmi. Vztahujú sa k sušenému stavu.

Návod na prípravu

Prosím dodržujte nasledujúce odporúčania. Nesprávna príprava alebo uchovávanie pripravenej fľaše by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa. Pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvú. Výrobok znovu nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy starostlivo umyte. Otvorený obal ihneď po odobratí výrobku dobre uzavrite, uchovávajte v suchu pri izbovej teplote a zamedzte kolísaniu teplôt. Výrobok spotrebujte do 3 týždňov od otvorenia obalu.

Nezohracujte výživu v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia).

Pitnú vodu pred každou prípravou čerstvo prevaríme a necháme vychladnúť na teplotu cca 40 až 50 °C.*

2/3 pripravenej vody nalejeme do fľašky.

Odmerku naplníme výrobkom a zároveň o hranu vo vnútri boxu.. Odmerané množstvo výrobku pridáme do fľašky.



Fľašku uzavrieme a dôkladne pretrepeme.

Pridáme zvyšok vody a opäť niekoľkokrát dôkladne pretrepeme.

Ochladíme na teplotu, vhodnú na pitie (cca 37 °C). Teplotu overíme.

*Aby nedošlo k poškodeniu prírodných kultúr mliečneho kvasenia (Laktobacily), nezalievajte výrobok vriacou vodou.

Mliečny prášok môže mať rôzne farebné variácie, toto je podmienené obsahom prírodných surovín.

Množstvo nápoja a dávkovanie

...môže byť rozdielne na základe individuálnych potrieb. Uvedená tabuľka je len orientačná. **Používajte prosím priloženú odmerku!**

Množstvo pripravenej výživy (ml)*	Na jednu dávku potrebujete	
	Množstvo vody (ml)	Počet odmeriek
170	150	5
200	180	6
235	210	7

1 odmerka prášku = 30 ml prevarenej pitnej vody.

*Pokiaľ lekár nestanoví inak, dojčatá potrebujú cca 5 jedál za deň. S každým novo pridaným príkrmom v skle alebo kašou odpadá jedno jedlo vo fľaške.