

Výživové údaje	100 ml pripravenej / pripravenej výživy**
Energetická hodnota / Energia (kJ / kcal)	285 / 68
Tuky (z toho)	3,7 g
- nasycené / nasýtené mastné kyseliny	1,6 g
- mononenasycené / mononenasýtené mastné kyseliny	1,6 g
- polynenasycené / polynenasýtené mastné kyseliny	0,5 g
- z toho kyselina linolová (omega-6 mastná kyselina)	0,41 g
- z toho kyselina alfa-linolénová / linolénová (omega-3 mastná kyselina)	0,06 g
- z toho kyselina dokosahexaenová / dokozahexénová (DHA)	13,6 mg
Sacharidy (z toho)	7,3 g
- cukry	5,6 g
- z toho laktóza	5,6 g
- škrob	1,7 g
Bielkoviny / Bielkoviny	1,4 g
Sodík	20 mg (5 %*)
Draslík	84 mg (8 %*)
Chloridy	52 mg (10 %*)
Vápnik / Vápnik	70 mg (13 %*)
Fosfor	38 mg (7 %*)
Hořčík / Hořčík	6,3 mg (8 %*)
Železo	1,0 mg (13 %*)
Zinek / Zinek	0,5 mg (10 %*)
Měď / Meď	0,054 mg (11 %*)
Jód	15 µg (19 %*)
Selen / Selén	3,9 µg (20 %*)
Mangan / Mangán	0,0075 mg (1 %*)
Fluoridy	< 0,010 mg
Vitamin A	56 µg (14 %*)
Vitamin D	1,6 µg (23 %*)
Vitamin E	0,90 mg (18 %*)
Vitamin K	3,1 µg (26 %*)
Vitamin C	10,0 mg (22 %*)
Vitamin B1	0,037 mg (7 %*)
Vitamin B2	0,12 mg (17 %*)
Niacin / Niacín	0,53 mg (8 %*)
Vitamin B6	0,042 mg (6 %*)
Kyselina listová	10,0 µg (13 %*)
Vitamin B12	0,10 µg (13 %*)
Kyselina pantothénová / pantothenová	0,35 mg (12 %*)
Biotin / Biotín	1,6 µg (16 %*)

*referenční hodnoty příjmu

*referenčné hodnoty príjmu

Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou obvyklé u výrobků z přírodních surovin.

**Standardní ředění: 13,2 g Bebivita 2 + 90 ml převarované pitné vody = 100 ml připravené výživy. 1 zarovnaná odměrka = 4,4 g Bebivita 2. / Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou běžné při výrobkách z přírodních surovin. **Standardné riedenie: 13,2 g Bebivita 2 + 90 ml prevarenej pitnej vody = 100 ml pripravenej výživy. 1 zarovnaná odmerka = 4,4 g Bebivita 2.

Složení: odtučněné mléko, rostlinné oleje (palmový, řepkový, slunečnicový), laktóza (z mléka), produkt mléčné syrovátky, škrob, LCP nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (rybí olej), uhličitán vápenatý, chlorid draselný, emulgátor lecithin, citrónan sodný, vápenatá soli kyseliny orthofosforečné, draselné soli kyseliny citrónové, uhličitán hořečnatý, L-tryptofan, L-askorbát sodný (vitamin C), síran železnatý, DL-alpha tokoferyl acetát (vitamin E), nikotinamid, oxid zinečnatý, D-pantotenát vápenatý, síran měďnatý, retinyl acetát (vitamin A), thiamin hydrochlorid (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), jodičnan draselný, kyselina listová, síran manganatý, seleničitan sodný, fytomenadion (vitamin K), cholekalciol (vitamin D), D-biotin. Vztahuje se k sušenému stavu.

Zložení: odtučněné mléko, rostlinné oleje (palmový, řepkový, slunečnicový), laktóza (z mléka), produkt mléčné syrovátky, škrob, LCP nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (rybí olej), uhličitán vápenatý, chlorid draselný, emulgátor lecithin, citrónan sodný, vápenatá soli kyseliny orthofosforečné, draselné soli kyseliny citrónové, uhličitán hořečnatý, L-tryptofan, L-askorbát sodný (vitamin C), síran železnatý, DL-alpha tokoferol acetát (vitamin E), nikotinamid, oxid zinečnatý, D-pantotenát vápenatý, síran měďnatý, retinyl acetát (vitamin A), thiamin hydrochlorid (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), jodičnan draselný, kyselina listová, síran manganatý, seleničitan sodný, fytomenadion (vitamin K), cholekalciol (vitamin D), D-biotin. Vztahuje se k sušenému stavu.

Pokračovací mléčná kojenecká výživa od ukončeného 6. měsíce, 500 g

Důležité upozornění:

...pro výživu Vašeho dítěte – Vylučné kojení je v prvních šesti měsících pro Vaše dítě ideální. Pokračovací mléčná kojenecká výživa není vhodná jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Pokračovací mléčná kojenecká výživa je určena pro děti od ukončeného 6. měsíce jako součást různorodé stravy. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla šesti měsíců by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě, v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrétního kojence.

...pro zuby Vašeho dítěte – Stejně jako mateřské mléko, obsahují také kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů s tekutinou obsahující sacharidy může způsobit vznik zubního kazu a s tím související zdravotní potíže. Krmte proto své dítě plynule, nenechávejte ho z láhve dlouho pít a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku.

Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.

Množství nápoje a dávkování

Množství nápoje na láhev může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Uvedené množství nápoje a počty láhví jsou pouze orientační.

Použijte prosím přiloženou odměrku!

Množství připravené výživy / Množstvo pripravenej výživy	Na jednu dávku potřebujete / Na jednu dávku potrebujete		
	Množství vody / Množstvo vody	Počet odměrek / Počet odmeriek	Množství prášku / Množstvo prášku
135 ml	120 ml	4	17,6 g
170 ml	150 ml	5	22,0 g
200 ml	180 ml	6	26,4 g

Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným příkrmem nebo kaší odpadá jedno jídlo v láhvi.

Návod k přípravě

Dodržujte přesně návod na přípravu mléčné kojenecké výživy i uvedené doporučení. Nesprávná příprava nebo uchování by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte, např. nárůstem nežádoucích bakteriálních zárodků. Proto připravujte výživu před každým kmením čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu při teplotě max. 25°C a zamezte kolísání teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otevření obalu. Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření). Před použitím se prosím přesvědčte, že balení zůstalo neporušené.

1. Pitnou vodu určenou pro kojence před každou přípravou čerstvě převaríme a necháme zchladnout na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. Připravenou vodu nalijeme do láhve (množství dle tabulky).
3. Odměrku lehce naplníme výrobkem a opačnou stranou nože zarovnáme. Odměřené množství výrobku přidáme do láhve.
4. Láhev uzavíráme a důkladně protřepeme.
5. Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37°C). Teplotu prověříme.



Následná mléčná kojenecká výživa od ukončeného 6. měsíce, 500 g

Důležité upozornění:

...pre výživu Vášho dieťaťa – Vylučné dojenie je v prvých šiestich mesiacoch pre Vaše dieťa ideálne. Následná mléčná kojenecká výživa nie je vhodná ako náhrada materského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života. Následná mléčná kojenecká výživa je určená pre deti od ukončeného 6. mesiaca ako súčasť rôznorodej stravy. Rozhodnutie začať podávať príkrmy, vrátane akejkoľvek výnimky z pravidla šiestich mesiacov, by malo byť prijaté len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa, v závislosti od individuálneho rastu a vývojových potrieb konkrétneho dieťaťa.

...pre zuby Vášho dieťaťa – Tak ako materské mlieko, obsahujú aj dojčenské výživy sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy Vášho dieťaťa. Častý alebo trvalý kontakt zubov s tekutinou obsahujúcou sacharidy, môže spôsobiť vznik zubného kazu a s tým súvisiace zdravotné problémy. Kŕmte preto svoje dieťa bez prerušovania, nenechávajte ho dlho piť z fľaše a naučte ho čo najskôr piť z pohára.

Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vášho dieťaťa.

Množstvo nápoje a dávkovanie

Množstvo nápoje na fľašu môže byť rozdielne na základe individuálnych potrieb. Uvedené množstvo nápoja a počet fliaš na deň sú len orientačné.

Používajte prosím priloženú odmerku!

Množství připravené výživy / Množstvo pripravenej výživy	Na jednu dávku potřebujete / Na jednu dávku potrebujete		
	Množství vody / Množstvo vody	Počet odměrek / Počet odmeriek	Množství prášku / Množstvo prášku
135 ml	120 ml	4	17,6 g
170 ml	150 ml	5	22,0 g
200 ml	180 ml	6	26,4 g

Dojčatá potrebujú cca 5 jedál denne. S každým novo pridaným príkrmom v skle alebo kašou odpadá jedno jedlo vo fľaši.

Návod na přípravu

Dodržujte presne návod na prípravu mliečnej dojčenskej výživy ako aj uvedené odporúčania. Nesprávna príprava alebo uchovávanie by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa, napr. nárastom nežiaducich bakteriálnych zárodkov. Preto pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvú. Zvyšky opakovane nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy starostlivo vymyte. Otvorený obal ihneď po odobraní výrobku dobre uzavrite, uchovávať v suchu pri teplote max. 25°C a zamedzte kolísaniu teplôt. Výrobok spotrebujte do 3 týždňov od otvorenia obalu. Nezhrievajte výrobok v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia). Pred použitím sa prosím presvedčte, že balenie ostalo neporušené.

1. Pitnú vodu určenú pre dojčatá pred každou prípravou čerstvo prevaríme a necháme schladieť na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. Pripravenou vodu nalejeme do fľaše (množstvo podľa tabuľky).
3. Odmerku zľahka naplníme výrobkom a opačnou stranou noža zarovnáme. Odmierané množstvo výrobku vložíme do fľaše.
4. Fľašu uzavrieme a dôkladne pretrepeme.
5. Schladíme na teplotu vhodnú na pitie (cca 37°C). Teplotu preveríme.

BEBIVITA 2 – Pokračovací mléčná kojenecká výživa od ukončeného 6. měsíce, 500 g

- **Vitamin C, D¹** - prispívajú ke správnej funkcii imunitného systému
- **Vitamin D¹** - prispívá k normálnému rastu kostí a zubov
- **Vitamin B2 a biotin¹** - podporuje správnu funkciu energetického metabolismu
- **Vitamin K¹**
- **Jód¹** - prispívá k správnej funkcii štítnej žľazy
- **Omega -3 mastné kyseliny (kys. alfa-linolénová)** - podporujú vývoj mozku a nervových buniek
- **DHA (kyselina dokosahexaenová)¹** - do 1.roka prispívá príjem DHA k normálnému vývoju zraku

¹ dle zákona

Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.

Použití: Bebivita 2 pokračovací mléčná kojenecká výživa je určená pro zvláštní výživu od ukončeného 6. měsíce.

- v návaznosti na kojení, pokud je Vaše dítě příkrmováno
- v návaznosti na jakoukoliv počáteční mléčnou kojeneckou výživu.

Na Bebivitu 2 můžete přejít z jakékoliv jiné pokračovací mléčné výživy. Skladujte v suchu při pokojové teplotě.

BEBIVITA 2 – Následná mléčná kojenecká výživa od ukončeného 6. mesiaca, 500 g

- **Vitamin C, D¹** - prispievajú k správnej funkcii imunitného systému
- **Vitamin D¹** - prispieva k normálnemu rastu kostí a zubov
- **Vitamin B2 a biotin¹** - podporuje správnu funkciu energetického metabolismu
- **Vitamin K¹**
- **Jód¹** - prispieva k správnej funkcii štítnej žľazy
- **Omega -3 mastné kyseliny (kys. alfa-linolénová)** - podporujú vývoj mozgu a nervových buniek
- **DHA (kyselina dokosahexaenová)¹** - do 1.roka prispieva príjem DHA k normálnemu vývoju zraku

¹ podľa zákona

Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vášho dieťaťa.

Použitie: Bebivita 2 následná mléčná kojenecká výživa je určená na osobitnú výživu dojčiat od ukončeného 6. mesiaca.

- v nadväznosti na dojenie, pokiaľ je Vaše dieťa príkrmované
- v nadväznosti na akúkoľvek počiatočnú mléčnú dojčenskú výživu

Na Bebivitu 2 môžete prejsť z akejkoľvek inej následnej mléčnej výživy. Skladujte v suchu pri izbovej teplote.

Výška plnění je technicky podmíněna. Baleno v ochranné atmosféře. Výška plnění je technicky podmienena. Balené v ochranné atmosfére.

Pokračovací mléčná kojenecká výživa od uk. 6. měsíce v prášku. Číslo výrobního závodu, minimální trvanlivost neotevřeného balení do: viz spodní strana / Následná mléčná kojenecká výživa od uk. 6. mesiaca v prášku. Číslo výrobného závodu, minimálna trvanlivosť neotvoreného balenia do: viď spodná strana



Hmotnost / Hmotnosť:
e 500 g

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici: info@bebivita.cz, www.bebivita.cz, Infolinka (po-pá 9 – 14 hod.): +420 724 369 006

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii: info@bebivita.sk, www.bebivita.sk, Infolinka: (po-pia 9-14 hod.): +420 724 369 006

Číslo výrobku: 1117-01 1034EM

HIPP Czech, s.r.o.,
Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5
Balené: Německo/Nemecko

