

**SCHOLL FUNGAL NAIL TREATMENT**  
**SCHOLL KÚRA NA NECHTOVÚ MYKÓZU 3,8 ML**  
**PRŮVODNÍ LETÁK K PRODUKTU**



**ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE**



*Distribútor: Twinner Hungária Kft. 2132 Göd, V. Körforgalmi út 1., Maďarsko  
info@twinner.hu, www.twinner.hu,*

*Vyrobené v: Európskej únii*

**KLINICKY OVERENÉ. VIDITEĽNÉ VÝSLEDKY UŽ PO 2 TÝŽDŇOCH.** Pôsobí proti nechtovej mykóze priamo v jej zdroji\* (\*Na základe in vitro údajov)

**Čím je Scholl Kúra na nechtovej mykóze iná?**

Scholl Kúra na nechtovej mykóze je špeciálne navrhnutý systém na ošetrovanie plesňového ochorenia nechtov. Produkt má diskrétnu balenie a ľahko sa používa. Bol vyvinutý tak, aby tekutá kúra prenikla do nechtu a pôsobila na mykózu priamo v jej zdroji. Pomáha predchádzať šíreniu infekcie a chráni pred jej opätovným výskytom.

Riešenie určené na domáce použitie bez lekárskeho predpisu.

**Ako kúra funguje?**

**Etapa 1** – Fáza ošetrovania (4 týždne) – pôsobenie na nechtovej pleseň.

1. Týždeň – Použite jeden pilník na nechty (pozri ilustráciu na prednej strane obalu), avšak iba raz, po použití ho okamžite zlikvidujte. Uchopte pilník v mieste loga Scholl a opilujte povrch infikovaného nechtu, aby ste odstránili vrchné vrstvy. Osobitnú pozornosť venujte zafarbeným častiam. Po použití pilník vyhodte. Z povrchu nechtu a okolia odstráňte prach. Pomocou štetca naneste kúru na povrch nechtu. Zotrite tekutinu, ktorá sa dostane na pokožku okolo. Vyčkajte 5 minút, než si obujete ponožky, topánky alebo pôjdete spať. Pre čo najlepšie výsledky si nohy 30 minút po aplikácii nenamáčajte. Kúru nanášajte raz denne po dobu 7 dní.

Tento postup zopakujte v **2., 3. a 4. týždni**. Na konci 4. týždňa použite posledný pilník na úpravu nechtovej a odstráňte nerovnosti na povrchu. Aplikujte kúru a pokračujte „preventívnou fázou“.

### **!Poškodený necht pilujte 1x týždenne – natierajte denne!**

#### **Etapa 2** – Preventívna fáza (9 mesiacov)

Na predchádzanie šíreniu a recidíve nanášajte kúru na postihnutý necht raz týždenne, kým neodrastie. Táto fáza môže trvať až 12 mesiacov v závislosti od rýchlosti rastu nechtu. Účinná látka pôsobí aj medzi aplikáciami. Počas používania kúry sa neodporúča lak na nechty ani umelé nechty. Nechty skracujte raz za mesiac – nikdy ich nestrihajte pod úroveň kože (ponechajte 2–3 mm).

Pred použitím si **MUSÍTE** pozorne prečítať návod. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pri podráždení prestaňte používať. Pilník nikdy nepoužívajte opakovane, aby ste predišli šíreniu infekcie. Len na vonkajšie použitie. Nepoužívajte na poranenú kožu alebo ak trpíte ochoreniami dolných končatín. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte do 25 °C.

#### **Aké sú viditeľné výsledky?**

Po skončení fázy ošetrovania sa zníži zafarbenie nechtu. Po 9–12 mesiacoch, čo je priemerný čas, za ktorý necht odrastie, zafarbenie zmizne a necht sa obnoví bez známok plesňovej infekcie. Klinická štúdia Scholl preukázala viditeľné výsledky už po 2 týždňoch.

## Čo spôsobuje nechtovú mykózu?

Ide o časté ochorenie spôsobené hubami, ktoré preniknú pod alebo do nechtu. Prenáša sa priamym kontaktom alebo prostredníctvom kobercov, ponožiek, obuvi a pančúch.

### Príznaky:

- žlté alebo hnedé sfarbenie nechtu
- biele „ostrovčeky“ na povrchu
- nechty sú drsnejšie, štiepia sa, objavujú sa ryhy

Ako vyzerá stredne závažná mykóza?

Príznaky netrvajú dlhšie ako 2 roky, zmena sfarbenia nezasiahla celý necht a neobjavila sa na viac než dvoch prstoch.

### Scholl a diabetes:

Ak trpíte cukrovkou alebo poruchami krvného obehu, **PORAĎTE SA S LEKÁROM**, pretože stav vašich nôh si môže vyžadovať odborné ošetrovanie.

### Je tento prípravok vhodný pre mňa?

Scholl Kúra na nechtovú mykózu je vhodná pri miernej až stredne závažnej mykóze. Poradte sa s lekárom, ak:

- príznaky trvajú dlhšie než 2 roky
- zafarbenie zasiahlo celý necht
- prejavy sú na viac než dvoch prstoch

Poznámka: Ak vynecháte jednu z denných aplikácií liečby, jednoducho pokračujte v používaní produktu podľa pokynov až do konca „liečebnej fázy“.