

Důležitá upozornění

Kojení je pro Vaše dítě to nejlepší. Potravina je vhodná pro výživu kojenců od narození, nemohou-li být kojeni. Pokud budete chtít použít počáteční kojeneckou výživu, poraďte se prosím s lékařem nebo osobou kvalifikovanou v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě. Jako mateřské mléko, obsahují také kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů se sacharidy může způsobit vznik zubního kazu. Proto nenechávejte Vaše dítě pít z láhve po dlouhou dobu a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku. Věnujte pozornost vyvážené stravě a zdravému životnímu stylu Vašeho dítěte. **HiPP HA1 Combiotik[®] nepoužívejte při stávající alergii na bílkovinu kravského mléka ani při podezření na vznik alergie.**

Složení

Laktóza (z mléka), rostlinné oleje (palmový olej¹, řepkový olej, slunečnicový olej), **hydrolyzovaná bílkovina mléčné syrovátky**, škrob, galaktooligosacharidy z **laktózy (z mléka)**, vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, chlorid draselný, emulgátor – estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou, směs olejů obsahujících LCP¹ (rostlinný olej z Mortierella alpina, **rybí olej**), L-tyrosin, L-fenylalanin, hydroxid draselný, hydroxid sodný, L-askorbát sodný (vitamin C), uhlíčený hořečnatý, cholin, L-tryptofan, uhlíčený vápenatý, inositol, mléčnan železnatý, sáran zinečnatý, L-karnitin, přírodní kultury mléčného kvašení (Lactobacillus fermentum hereditum²), D-pantothenát vápenatý, retinyl-acetát (vitamin A), nikotinamid, sáran měďnatý, DL- α -tokoferyl-acetát (vitamin E), thiamin hydrochlorid (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), sáran manganatý, jodičnan draselný, kyselina listová, fytomenadion (vitamin K), selenan sodný, D-biotin, cholekalciol (vitamin D), kyanokobalamin (vitamin B12). Vztahuje se k sušenému stavu.

¹ z certifikovaného trvale udržitelného hospodářství.

² LCP = polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, ³ Lactobacillus fermentum CECT5716

Návod k přípravě


Prosím dodržujte následující doporučení. Nesprávná příprava nebo uchování připravené láhve by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte. Připravujte výživu před každým krmením čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu při pokojové teplotě a zamezte kolísání teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otevření obalu. Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření!).

Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření).

Pitnou vodu před každou přípravou čerstvě převaříme a necháme zchladnout na teplotu cca 40 až 50 °C.*

2/3 připravené vody nalijeme do láhve.

Odměrku lehce naplníme výrobkem a zarovnáme o hranu výrobku uvnitř boxu. Odměřené množství výrobku přidáme do láhve.



Láhev uzavřeme a důkladně protřepeme.

Přidáme zbytek vody a opět několikrát důkladně protřepeme.

Zchladíme na teplotu, vhodnou k pití (cca 37 °C). Teplotu ověříme.

* Aby nedošlo k poškození přírodních kultur mléčného kvašení (Lactobacily), nepřeléváme výrobek vařící vodou.

Mléčný prášek může mít různé barevné variace, toto je podmíněno obsahem přírodních surovin.

Množství nápoje a dávkování

...může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Uvedená tabulka je pouze orientační.

Používejte prosím přiloženou odměrku.

Věk	Počet láhví/den	Množství připravené výživy, ml	Na jednu dávku potřebujete	
			Množství převařené vody, ml	Počet odměrek
1. - 2. týden*	5-7	70	60	2
3. - 4. týden	5-7	100	90	3
5. - 6. týden	5-6	135	120	4
7. - 8. týden	5	170	150	5
3. - 4. měsíc	5	200	180	6
od uk. 4 měsíce**	5	235	210	7

*pokud lékař nestanoví jinak. ** od ukončeného 4. měsíce věku můžete po dohodě s lékařem začít s přímkry. Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným přímkrem odpadá jedno jídlo v láhvi. 1 odměrka prášku = 30 ml převařené pitné vody.