

Substral Komplex postřik je komplexní fungicidní a insekticidní ochrana ve spreji pro celoroční ošetření růží, ale i ostatních kvetoucích a okrasných zahradních rostlin proti savým a žravým škůdcům, padlí růžovému, černé skvrnitosti růží a rzi růžové. Substral Komplex je vstřebáván listy a rozváděn po celé rostlině (listy, lodyha i pupeny). To umožňuje kontrolu i proti skrytým a obtížně likvidovatelným škůdcům.

Charakteristika:

Kombinovaný přípravek k okamžitému použití bez nutnosti dalšího ředění - systémový insekticid a systémový fungicid

Učinné látky:

acetamiprid 0,05 g/l

tj. (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl] - N2 - kyano - N1 - methylacetamidin

triticonazole 0,15 g/l

tj. (±)-(E)-5-(4-chlorbenzyliden)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentan-1-ol

Působení přípravku:

Účinná látka acetamiprid je systémově vysoce účinný insekticid působící jako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Acetamiprid působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální vyrovnaný účinek proti všem vývojovým stádiím škůdců. Účinná látka triticonazole patří do skupiny triazolů je systémově účinný fungicid. Účinkuje velmi dobře v nízkých dávkách proti patogenům nacházejícím se na povrchu i hlouběji v rostlinách. Působí preventivně a při použití v raném stádiu napadení i kurativně.

Přednosti přípravku a balení RTU:

Hubí mšice již během 24 hodin.

Potlačuje existující infekci černé skvrnitosti, padlí a rzi.

Chrání rostliny včetně nových přírůstků proti napadení mšicemi a houbovými chorobami.

Praktický předem namíchaný opakovatelně použitelný přípravek pro dvojí ochranu tzn. bez nutnosti okamžitého spotřebování.

Jednoduché a bezpečné použití bez nutnosti ředění.

Inteligentní řešení pro "čistou" a jednoduchou manipulaci.

Praktické řešení pro použití na balkonech, terasách, zimních zahradách, sklenících apod.

Použití:

Před použitím je třeba přípravek důkladně protřepat. Poté stiskneme pevně nástavec aplikační části ihned za tryskou k odblokování dětské pojistky a současně pootočíme o 1/4 otočky - do postřikovací polohy SPRAY. Následně postříkáme rostliny určené k ošetření z horní i dolní strany listů. Po ukončení aplikace vrátíme nástavec aplikační části do polohy OFF.

Dávkování:

> okrasné rostliny - venkovní prostory (mšice, černá skvrnitost růže, padlí, rez) postřik ukončit při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny / OL 0 dní (interval mezi jednotlivým ošetřením 21 - 28 dní; max. 4x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:

Aplikujeme ihned po prvních příznacích napadení rostlin.

Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin se doporučuje před jejich provozním ošetřením ověřit citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo na menším počtu rostlin. Za velmi slunných a teplých dnů tzn. nad 25 °C aplikujeme pouze v ranních nebo večerních hodinách. Pro minimalizaci negativního účinku na včely se doporučuje aplikovat Substral Komplex buďto ráno (7-9 hod), nebo večer (18-20 hod) kdy jsou včely méně aktivní.

Antirezistentní strategie:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujeme tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

Přípravek je zvláště nebezpečný pro včely.

Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujeme na kvetoucí rostliny.

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, vodních organismů, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců kromě včel, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů.

Upozornění:

Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.